


**¿Qué es Curaderm<sup>BCC</sup> y para que se usa?**

Décadas de investigación científica sobre las propiedades anti tumorales de glucoalcaloides naturales derivados de plantas de la familia Solanaceae han llevado a la formulación de Curaderm<sup>BCC</sup>, un tratamiento que incorpora la acción queratolítica del ácido salicílico, ácido láctico y la urea para remediar la actividad proliferativa celular, actuando también a través de la acción citoprotectora de los glucoalcaloides. Más aún, Curaderm<sup>BCC</sup> permite la penetración de otros agentes terapéuticos, incluyendo moléculas con acción farmacológica.

**Uso previsto:** Tratamiento tópico con acción queratolítica, adyuvante en el tratamiento y la cura de carcinoma basocelular de la piel localizado.

**Lo que necesita saber antes de usar Curaderm<sup>BCC</sup>**

**No use Curaderm<sup>BCC</sup>** si es alérgico a solasodina glucósidos o algún otro componente de este tratamiento.


 **Advertencias y precauciones** Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental, elimine la pomada enjuagando generosamente con agua y consulte a su médico lo antes posible. No ingiera este remedio. Si es ingerido accidentalmente, consuma cantidades generosas de agua y consulte a su médico. Asegúrese que su piel ha sanado completamente de cualquier otro tratamiento o cirugía antes de usar este remedio. No aplique Curaderm<sup>BCC</sup> en heridas abiertas o piel dañada. No aplicar este tratamiento internamente, ni en regiones cercanas al ojo, dentro de las fosas nasales, dentro de las orejas o en los labios. Evite lo más posible la exposición solar (incluyendo lámparas y camas solares). Este remedio es para el tratamiento de un carcinoma basocelular de un máximo de 25 cm<sup>2</sup> o múltiples de menor tamaño, hasta que sanen completamente. No usar en caso de sospechar carcinoma espinocelular, melanoma, u otra neoplasia de piel que no sea carcinoma basocelular. No aplique más crema de la que su doctor le ha indicado. Anticipe irritación local de la piel, como enrojecimiento e inflamación, durante el tratamiento con este remedio. Contacte a su médico si la reacción local de la piel empeora.

**Curaderm<sup>BCC</sup> y otros tratamientos:** Comunique a su médico o farmacéutico si está usando, ha usado recientemente, o pueda llegar a usar cualquier otra medicación. Antes de comenzar este tratamiento, comunique a su médico si usted ha usado previamente Curaderm<sup>BCC</sup> o algún otro remedio similar.


**¿Cómo utilizar Curaderm<sup>BCC</sup>?** Utilice siempre este remedio de acuerdo a las instrucciones proveídas por su médico. Confirme con su médico o farmacéutico si tiene alguna duda.

**Instrucciones para su uso**


- Lave las lesiones y piel aledaña con una solución de jabón suave y no-irritante.
- Enjuague con agua
- Seque bien
- Desenrosque la tapa del pomo de Curaderm<sup>BCC</sup> y remueva el sello protector.
- Aplique Curaderm<sup>BCC</sup> sobre la lesión, solo lo necesario para cubrirla. No aplique pomada en cantidades excesivas y no la extienda más allá de 5 cm sobre la piel de apariencia normal que rodea a la lesión.
- Aplique la pomada a la lesión exprimiendo suavemente el tubo.
- Cubra la lesión con un vendaje oclusivo como Micropore, Leukopor o Duoderm (no utilizar una tiritita), hasta la siguiente aplicación de Curaderm<sup>BCC</sup>.
- Aplique pomada a la lesión al menos dos veces al día; cada doce horas como mínimo.
- Si el tratamiento se extiende por más de 12 semanas, por favor contacte a su médico o farmacéutico.

 **Posibles efectos secundarios:** Este tratamiento puede causar efectos secundarios, aunque no todos los usuarios los experimentan. Con el uso de este tratamiento, es probable que la zona de aplicación se enrojezca y ulcere. Este efecto puede aparecer dentro de las 24 horas después de la primera y segunda aplicación. Este efecto puede empeorar durante las 2 semanas iniciales de tratamiento. La lesión va a aparentar agrandarse durante las primeras etapas del tratamiento, esto es normal. La aplicación puede ser dolorosa (incluyendo quemaduras en el sitio de aplicación). El tratamiento debe continuarse hasta que la lesión desaparezca. Infecciones del área tratada son muy infrecuentes.

**Comunicación de efectos secundarios:** Si experimenta algún efecto secundario, por favor comuníquelo de inmediato al fabricante y a las correspondientes Autoridades Sanitarias de su territorio. También se incluyen posibles efectos no listados en este prospecto.

**¿Cómo almacenar Curaderm<sup>BCC</sup>?** Mantenga este producto sanitario fuera del alcance de niños. No utilizar pasada la fecha de caducidad, la cual está impresa en el tubo sobre . La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

Almacenar por debajo de 25°C. (2°C-8°C en el refrigerador después de abrir el tubo).  
Para usos múltiples.



**Curaderm<sup>BCC</sup> contiene**

Agua, ácido salicílico, parafina líquida, petrolatum, ácido láctico, alcohol cetearílico, cetearth-20, urea, propilenglicol, solasodina ramnósido, goma xantana, p-clorocresol.



**Fabricante**  
Curaderm Global Ltd.  
PMB 7031, Port Vila  
Republic of Vanuatu  
South Pacific

**Representante autorizado**  
Curaderm Europe B.V.  
Joop Geesinkweg 701  
Duivendrecht  
1114 AB Amsterdam  
The Netherlands

